

瘍

醫

大

全

瘍醫大全目錄

卷七

論初起腫瘍

論內消法

癰疽腫瘍門主方

癰疽門丹散主方

癰疽門膏藥主方

瘍醫大全卷七

蕪

顧世澄練江氏纂輯

增修之栢東陽

男

棚燹用和

全校

論初起腫瘍

證

曰初起腫瘍者乃癰疽惡毒始發壅腫七日之內

未成膿者目曰腫瘍施治之

儘可內消十二日

七縱不能全消亦可移深居淺轉重就輕但不可

驟用寒涼敷藥冰凝肌肉更勿輕投苦寒丸劑凝

滯氣血渴鬱毒氣難消散若已臭入九朝內膿已

成治無消法若勉彊消之不獨不能消散反致氣  
血受虧根脚散漫內膿不能外泄膿汁清稀所以  
消腫湯之法貴乎昇也

## 論內消法

王肯堂曰癰疽之證發無定處欲令內消於初起紅腫結聚之際施行氣活血解毒消腫之藥是也當審淺深大小經絡處所形脉虛實如發於腦背腰項臂膕者乃太陽經也宜黃連羌活背連脇處爲近少陽宜柴胡並宜敗毒散仙方活命飲形實脉實者宜漏蘆湯內連以連湯追毒丸疎利之氣虛者參耆爲主血虛者歸芎爲主雖以消毒之藥隨分野以引經藥行至病所六經分野止有癰疽其

五經各隨本經標本寒溫氣血多少以行補瀉惟  
少陽經雖曰氣多血少而氣血皆不足也治與  
氣虛血虛同法凡瓜蒌射干穿山甲金銀花夏枯  
草蟾酥連翹地丁鼠粘子木鱉子之類爲內消之  
藥仙方活命飲內消丸柞木飲子牛膠飲子車螯  
散返魂丹消毒飲爲內消之方衆皆知之殊不知  
補瀉虛實平治寒溫使氣血各得其常則可內消  
也其外用紫葛湯淋洗及用散塗膏貼者亦使氣  
血和平而腫消熱退也

李東垣曰夫癰疽丹腫之生皆由陰陽不調榮衛凝  
澀氣血不流之所生也古人有言曰陽滯於陰則  
生瘡陰滯於陽則生疽瘡疽之生有內有外內生  
於臟腑胸腹之中外生於膚肉筋骨之表發無定  
處夫鬱滯之本則因氣血不流蒸氣不能外達留  
滯而成內熱瘡疽所生焉若初覺氣血鬱滯皮肉  
結聚腫而不潰時可疎滌風熱通利臟腑一二行  
後徐與用諸湯渴漬卽得內消矣不然則治之稍  
慢毒熱蒸散反攻其內致令膿血之聚也內經謂

治病必求於本蓋瘡疽本乎中熱之鬱結不通也其風邪寒氣所聚也治之宜溫熱之劑和血令內消也辨之有法須認風寒則腫硬色白熱毒則焮腫色赤以爲異也如有氣已結聚不可用內消之法宜用排膿托毒之藥此皆先後之次也

又曰消者滅也滅其形症也經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火火者離卦也離者外陽而內陰內陰壅滯必然外攻治當內消使絕其源而清其內不令外發故云內消乃初起微覺之時卽以湯液丸散內服



外敷疎其源絕其毒卽時消散如形症已成不用此法也

程山齡曰內消者腫毒初起卽用藥消散也凡病癰疽發背對口疔毒其初起憎寒壯熱有似傷寒而痛偏着一處飲食如常者蓄積有膿也當初起時膿尚未成不過氣血乖違逆於肉裏耳外敷遠志膏或金黃如意散鐵箍散或貼普救萬全膏內服銀花甘草湯或內消散卽時消散若係疔瘡卽宜刺破或艾灸腫處土撈鹽酥餅貼以萬全膏內服

菊花甘草湯隨即平伏菊花連根帶葉皆治疔瘡  
之聖藥也其中亦有挾風寒而發者又宜先用荆  
防散或芎芷香蘇飲冬月萬靈丹以散之隨服銀  
花菊花等藥即可內消務須及早下手不可遲滯  
十法

癰疽腫瘍門主方

內消散 正宗

金銀花

知母

穿山甲

半夏

大貝母

乳香 去油

天花粉

白芨

皂角針 各一錢

酒水全煎熱服取汗 搗加秋芙蓉葉二兩搗

敷患上留頂透氣

立消散

生地

龍膽草

柴胡

防風

荊芥穗

槐花

青木香

各等分

升麻

加

膠

下部

酒水全煎熟服取汗輕可立消重者二劑如已成將潰禁服

銀花甘草湯

十法

一切惡毒肺癰初起立消誠外科捷法

鮮金銀花

五兩

甘草節

一兩

作一劑入砂銚內水二碗煎一半加無灰酒一大碗畧煎數沸分作三服一日夜服完重者二

劑服至大小便利則藥力到矣如下部加牛膝  
外用生金銀花搗爛敷四圍中留一孔透氣  
沈內翰云金銀花乾者終不及鮮者力大而效  
速

四妙湯

卽神效托裏散  
說約

此瘍科首用捷法功效立奏增減活法醫者臨  
症酌用

生黃耆

五錢

大當歸

金銀花

各一兩

甘草節

二錢

癰疽大全 卷六  
六煎晝夜服盡自可移深居淺轉重作輕如已成氣血素虧不能穿潰者加白芷皂針山甲各二錢一伏時自潰如已潰後卽宜刪去皂針山甲如初起熨痛口渴加天花粉此治癰疽發背腸癰之神方也

澄自初及今數十年來凡治一切癰疽皆賴此方遇大症金銀花每加至六兩四兩黃芪加至兩許當歸加至二兩甘草節加至三錢但見瘡色不起膿水清稀卽加肉桂轉陰爲陽化毒成

膿如乳癰乳吹卽加蒲公英一兩立消百發百

中萬穩萬當

大毒惡瘡初起卽消已成白潰

廣陳皮

二錢五分

白芷

當歸尾

乳香

去油

甘草節

沒藥

去油

天花粉

防風

川貝母

去心

赤芍

穿山甲

皂針

各一錢

連翹

肉桂

各八分

酒水全煎熱服取汗

忌犯鐵器

孕婦忌服

槐花酒 彭辛菴用此方三十年無不見效

初起大毒焮腫服之內消

槐花

四兩入砂鍋內炒黃乘熱入酒二碗煎十餘沸

濾去渣熱服取汗如未消再服極效

活血調氣湯

專主消毒散瘀

荊芥

天花粉

防風

赤芍

陳皮

各一錢二分

甘草節

八分

川貝母 去心

金銀花

白芷



當歸尾 各二錢

水煎服

背上及冬月加

羌活

內熱及夏月加

連翹 山梔

消腫加

牛蒡子 穿山甲

痛甚加

乳香 沒藥 蒼朮

小便澀加

木通

泄瀉加

消無名大毒

陳琉璃砥

炙黃存性

研極細輕者三錢重者五錢無灰酒冲服取汗

忌風

神授衛生湯 正宗

解毒消腫清熱活血止痛

白芷 天花粉 連翹 各八分

牛蒡子 荊芥 甘草節 各一錢

乳香 去油 沒藥 去油 防風 各五分

金銀花 三錢 當歸尾 川貝母 各一錢五分

水煎服 若大便秘結熱甚者加大黃 酒炒一錢

芎芷香蘇散 十法

凡毒初起多有挾風寒而發者宜先用此藥

川芎

紫蘇

赤芍

陳皮

荊芥

香附

秦艽

白芷

甘草

引加葱頭二寸水煎服

傷食加

山查肉  
麥芽

蘿蔔子

真人活命飲

治初起癰疽發背一切腫毒疔瘡惡證

金銀花

白芷

天花粉

陳皮

穿山甲

防風

甘草節

當歸

皂角刺

赤芍

川貝母

日五錢

其毒在背以皂角刺爲君加紫花地丁

其毒在胸加瓜蒌仁三錢

其毒在腹以白芷爲君

其毒在四肢以金銀花爲君

如疔瘡加草紫河車

右咀片每服用無灰酒十茶鍾如毒小各減半  
用有嘴瓶裝厚紙蓋口勿令洩氣煎至五鍾去

搗作三五服接連頻服搗再煎此藥宜無灰酒  
不可用酸薄酒莫犯鐵器服後側卧睡一覺定  
有回生之意神功浩大之至

內消大毒

蘇木槌碎煎酒服

內消

槐

花

一兩炒  
深黑

核

桃

十個連殼燒  
黑去殼取肉

研細和酒服取汗自消

消毒聖神湯

岐天師

金銀花 四兩

天花粉 五錢

蒲公英

當歸

生甘草 二錢

水煎服一劑卽消二劑全愈不必三劑

蓋金銀花專能內消瘡毒然非多用則力輕難以成功生甘草一味已足解毒况又用之於金銀花內益足以散邪而衛正蒲公英陽明經藥也且能散結逐邪天花粉消痰聖藥當歸活血是以專功血不活所以生癰今血活而癰自愈此方之所以奇而肆也

孫真人初起立消

金銀花 三兩

白礬 一兩

水煎服一劑卽消發背亦然

雷公消癰疽

當歸 一兩

天花粉 三錢

附子 一片

生甘草

元參 各五錢  
金銀花 三兩

白礬 一錢

水煎服初起一劑卽消腫者二劑必消

華佗真君消癰疽

金銀花 三兩

當歸 一兩

天花粉 五錢

蒲公英

生甘草 各三錢

水煎服

孫真人統治諸癰

金銀花 一兩

蒲公英 五錢

天花粉 三錢

甘草 一錢

水煎服一劑輕二劑全愈此方消毒實有奇功

內消方

金銀花 四兩

甘草 二兩

蒲公英 一兩

元參 五錢

當歸 一兩

水煎服一劑卽消

華丘君消頭面瘡疽



當歸 一兩

金銀花 二兩

黃芩 一錢

蒲公英

桔梗 各三錢

生甘草

川芎 各五錢

水煎服一劑輕二劑全消不必三劑

華真君消癰萬全湯

治身上手足之瘡疽

金銀花 三兩

當歸 一兩

牛蒡子 二錢

蒲公英

生甘草 各三錢

天花粉 五錢

芙蓉葉

七個無葉時用梗三錢

水煎服一劑卽消二劑全愈

岐天師消癰

消中部癰疽

當歸

金銀花

白芍

元

參

各一兩

甘草

五錢

荆

芥

梔

子

各三錢

白芥子

白

礬

連

翹

各二錢

水煎服一服知二劑全消破潰者四劑愈如陰疽去梔子加肉桂一錢

張仲景統治癰疽

當歸

蒲公英

甘草

各一兩

金銀花

二兩

乳香

去油

黃芩

各一錢

水五碗煎一碗調乳香末服之

化癰湯

雷眞君

金銀花

五兩

元參

三兩

當歸

二兩

荊芥

白芥子

各三錢

肉桂

三分

水煎服

雷眞君消癰方

癰疽發背或生於頭頂或生於胸腹或生於手足臂腿腰臍之間前陰糞門之際肺癰大小腸癰母論陰毒陽毒初起一服立消已潰者卽斂

金銀花

四兩

當歸

二兩

蒲公英

元參

各一兩

水五碗煎八分饑服一劑盡化爲無有矣切勿嫌其藥料之重減去分兩則功亦減半矣此方旣善攻散諸毒又不耗損真氣可多服久服俱無碍

岐天師消癰湯

金銀花

當歸

蒲公英 各一兩

荊芥

連翹

各一錢 生甘草 三錢

水煎服一劑輕二劑消三劑愈

天下第一消發背方

紫花地丁

金銀花

雅連 酒製

黃花地丁

槐花 各一兩

分四劑水煎服隨用溫水洗四肢取微汗後毒氣下行四肢生小瘡而發背自消矣

葳靈仙散

消初起腫毒惡瘡

貝母

葳靈仙

知

母

炒各一兩

蟬

酥

五厘

研細酒調空心服參錢每日二服以消爲度

二仙丹

消初起發背

穿山甲

七片

牛皮膠

四兩

全放新瓦上燒存性研細好酒調下任量飲醉

出汗爲度

初起腫毒

錢青掄

全當歸

八錢

生黃耆

金銀花

各五錢

甘草節

一錢八分

水煎服立消

上部加白芷

一錢八分

中部加杜仲

下部加牛膝各

消壯盛人腫毒

李飛霄

穿山甲

土炒研

何首烏

切各二兩

牛膝

一兩

作一劑酒水全煎服立消

癰疽發背歌訣

古方

真人妙訣世間稀一切癰疽皆可醫  
化血就如湯潑雪消膿立效肉生肌  
任他發背賺瘡毒那怕疔瘡癰癰  
癰兒假饒疥癰並風癰乳疽五背盡  
消除

金銀花

在四肢倍加

白芷

在腹脇倍加

甘草節

防風

沒藥

去油

赤芍

陳皮

各三錢

當歸

一分

乳香

去油

川貝母

沉香

各一錢

廣木香

八分



穿山甲

蛤粉炒黃去粉

皂角刺

剉碎鉛粉八錢全炒黃去粉各五錢

右藥將乳香穿山甲

另研細末分作四包

其餘藥分四劑

河水二鍾煎七分加好酒半鍾調乳香穿山甲

末上部飽服下部空心服

消大毒

周鶴仙

金銀花

二兩

廣膠

一兩

全當歸

一枝要一兩重者

木通

五錢

甘草節

二錢

用無灰酒不拘多少鍋內煎上部飽服下部空

心服服後儘量飲醉蓋煖取汗卽消神速無比

初起立消 周鶴仙

大瓜萐

一個頂上切去一片將子挖盡裝入婦人梳下油膩亂髮一大團再入明礬三錢以滿爲度仍將切下一片蓋口週身將黃泥封裹新瓦上微火煨過去泥將存性瓜萐研爲細末

作一服黃酒調服未潰者必消將潰卽出膿收口重者三服必驗

內消

蟹殼

患小用一殼患大用二殼瓦上炙脆研細

臨睡時黃酒冲服

立馬消 劉秘

川斑猫

大者是川產者佳去翅足糯米拌炒

全蝎尾

各一百五十個

蜈蚣

三十條乳

香去油

沒藥

去油各四錢

真蟾酥

三錢酒浸研膏

冰片

麝香

各二錢

右爲細末用麻黃四兩熬膏爲丸如桐子大硃

砂爲衣畧晒乾磁瓶密貯凡遇發背癰疽腫毒

每用一九如勢大者用二三九乳細摻於太乙

膏上如瘡未破貼上以熱手摸百餘下次日卽

消如瘡已破先以薄綿紙蓋瘡上再貼奏功

蒼龍丸 劉秘

消諸般大毒

蒼龍 三百條 硃砂

明礬

明雄 各三錢 礬 酒化

礬砂 各一錢

乳細麴糊丸如桐子大每服七丸九丸十一丸  
酒水任下取汗自消

追毒丸 方汝聖

青竹蛇

防風

穿山甲 炮

羌活

猪牙皂 各三錢 全蝎 二對

當門子

蟾

酥

各三分

瓜兒竭

乳香

去油

孩兒茶

沒藥

去油

明雄黃

白

砒

肉製

大硃砂

茜草

雷公藤

各五分

甘草

當歸尾

各八分

蜈蚣

蚣

三條

金銀花

五錢

共乳極細末凡一切癰疽大毒大人每服三分

至五分止小兒一分至二三分止無灰酒調服

令醉自消

消癰疽癰毒並天泡楊梅等瘡

香油一觔入水半鍾熬至油耗白烟起住火以磁  
瓶收貯每早晚用熟油一鍾將無灰酒一鍾和勻  
溫服七日除根

消毒湯 一名紫花地丁散

甘草 一錢 金銀花 紫花地丁 去蘆

太黃 酒浸炒 當歸 黃耆

赤芍 各五錢

一方加升麻爲末作二劑酒煎服

內消沃雪湯 正宗

治發背並五臟內癰尻醫諸毒大小腸癰肛癰  
臟毒初起但未出膿堅硬疼痛不可忍者並效

青皮

乳香去油

陳皮

甘草節

穿山甲

金銀花

沒藥去油

連翹

黃耆

天花粉

皂角刺

川貝母

當歸

白芍

射干

白芷各八分廣木香四分

水酒各一碗煎至八分甚者加大黃二錢量病

上下食前後服

飛騰神駿膏 壽世保元

治癰疽發背癰癰專門之方初起至破潰時皆

可服捷如奔馬

杏仁

熱水泡去皮尖用砂鉢搗開再  
又入水全搗澄去濁渣用清汁

地骨皮

去骨淨防風去蘆淨甘草各四兩

黑鉛

一塊

木鱉子

去殼十個

黃

二觔去節取一觔淨

燈草

一大把

頭

髮

一大把溫水洗淨

右藥熬時不用柴燒用炭五十觔大鐵鍋一口



將藥入鍋內注清水二三桶煮至五六分看藥水濃時濾去藥渣將汁另放缸注又將前渣入鍋內再入水一二桶又熬至五六分藥汁又注前汁內如前法三次去渣將前二次汁併作一鍋熬至乾去黑鉛頭髮燈草其味香甜磁罐收貯五年不壞凡遇前症每服三錢熱酒調臨臥服厚被蓋出大汗爲度徐徐去被不可被風吹汗後恐致虛人次早煨猪蹄以補之以復元氣好酒調服隨人酒量以醉爲度汗出立愈

國老膏

一切癰疽將發預期服之能消腫逐毒使毒氣  
不內攻

大甘草有粉者二觔搥碎河水浸一宿揉令漿汁  
濃去渣慢火熬成膏每服一二匙不拘時無灰酒  
下

立效散

錦囊

治癰疽瘰癧

皂角刺

半觔炒赤

粉甘草

二兩

黃瓜蘗

五個連皮研碎

乳香

去油另研

沒

藥

去油另研  
各一兩

每服一兩好酒煎服

神效瓜蒌散

癰疽乳癰瘰癧與立效散相間服

黃瓜蒌

一枚杵碎

沒

藥

去油另研一錢

當歸尾

甘草節

各五錢

酒三碗煎一碗分三次服未成卽消已成卽潰

神仙截法

集驗

癰疽發背一切惡瘡預服毒不內攻可保無虞

湯醫大全

卷七

腫瘍方

圭

顧氏秘書

豈蘇油一觔銀器內煎數十沸傾出候冷入無灰  
酒兩鍾約五大鍾重湯稍熱通口急服一日飲盡  
爲妙如患數日者亦宜急服之

此法傳之於吳安世云吾家三世用之無不奇驗  
又聞獵者云凡誤中藥箭急飲麻油則藥毒不行  
後果於西山親觀人被虎箭穿股者號叫不忍聞  
急以麻油灌之良久遂定又聞鄭學論德甫云渠  
尊人曾用之有驗

如意酒 潘佩侯

一切癰疽瘡毒服之解毒消腫止痛

新鮮大如意草

綱目名夜叉頭草  
又名犁尖草

每用一兩搗爛滾酒冲入少頃擠汁溫服搗敷  
腫上縛住三服愈 如無新鮮者取葉陰乾爲  
末爲丸服亦可

癰疽未成卽消已成卽潰已潰卽斂

凌秘

蛇蛻

不拘多少用陰  
陽瓦煨存性

研細每早晚俱用米糕蘸食

保安萬靈丹

正宗

癰疽疔毒對口發背發頤風濕風溫濕痰流注  
附骨陰疽鶴膝風證左癱右瘓口眼喎斜半身

不遂氣血凝滯遍身走痛步履艱辛偏墜疝氣  
偏正頭風頭痛破傷風牙關緊閉截解風寒無  
不應驗

茅蒼朮

半觔

全蝎

何首烏

川烏

泡去皮尖

荆芥穗

草烏

泡去皮尖

炙甘草

川芎

釵石斛

羌活

明天麻

麻黃

北細辛

防風

全當歸

各一兩

明雄

六錢

右爲細末煉蜜丸彈子大每藥一兩分作四丸  
一兩作九九一兩作六九三樣做下以儻年歲  
老壯病勢緩急取用預用硃砂六錢乳細爲衣  
磁罐收貯如惡瘡初起二三日之間或癰疽已  
成至十朝前後但未出膿者狀若傷寒頭痛煩  
渴拘急惡寒肢體疼痛惡心嘔吐四肢沉重恍  
惚悶亂坐卧不寧皮膚壯熱又治傷寒四時感  
冒傳變瘟疫但惡寒身熱表證未盡者俱宜用  
之用連鬚葱白九根煎湯一茶鍾將藥一丸乘

熱化開通口服盡被蓋出汗爲效如服後汗遲  
再用葱白湯催之後必汗如淋洗漸漸褪下覆  
蓋衣物其汗自收自斂患者自然爽快其病如  
失但病未成時隨卽消去已成者隨卽高腫如  
潰膿諸疾無表證相兼不必發散者只用熱酒  
化服此方原載內科諸風癰疽門中 陳實功  
先生用以發散瘡毒其功甚捷詳觀此方乃治  
腫瘍之神丹也

澄按此方固乃發散腫瘍之神丹然藥性猛烈



只宜於強壯藜藿之人凡無憎寒壯熱及平日  
表虛氣弱素多痰火並有孕婦人臨經女子均  
宜禁服

太乙紫金丹 卽紫金錠又名玉樞丹

解諸毒療瘡腫利閑竅通治百病立建奇功  
能起死回生凡居家出入興大兵動大工不可  
無之

山茨菇 洗淨二兩 五倍子 搥碎洗淨 千金子 去殼去油淨各一兩

飛硃砂 明雄 當門子 各三錢

紅芽大戟

去蘆根焙  
一兩五錢

以上藥於淨室中各爲細末候端午七夕或天  
德月德日合以糯米濃粥湯和勻杵干下凡合  
藥切忌婦人鷄犬見每錠一錢每服一錠或半  
錠開水磨服病在上者必吐在下者必利吐利  
後以溫粥補之

一治飲食藥毒菌毒河豚毒自死牛馬猪羊等  
毒肉悞食之必脹悶昏卧急用水磨一錠灌  
之或吐或瀉立甦  
一癰疽發背對口疔瘡天蛇毒楊梅瘡每用無  
灰清酒磨服外用無灰水磨塗瘡上日夜數次覺  
瘡自消

一治喉痺喉風喉疔乳蛾等證並用薄荷湯磨服一錠卽見消散

一治絞腸痧烏痧脹通腹攪痛非常用清水磨服一錠

一治婦人邪氣鬼胎用石菖蒲煎湯磨服一錠卽消

一治自縊溺水魘夢鬼魅迷人但心頭微溫者俱用薑汁磨服立甦

一治惡蛇瘋犬毒蝎溪澗諸惡蟲傷人隨卽發腫攻刺走痛或悶絕喊叫命在須臾急用清

酒磨下一錠仍取他人口涎磨敷傷處再服葱湯一大碗被蓋出汗其人必活

一治天行時疫延門傳染用米湯磨濃塗鼻孔中仍以白湯磨服少許卽不傳染

一治傳屍癆瘵諸藥不效者每用一錠清水磨服三日卽下惡物有女子患癆瘵方士教服

此錠片時吐下小至十餘條後服藥合丸其病頓愈以此相傳活人不記其數此真濟世

衛生之寶藥也

萬病解毒丸 錦囊

癰疽發背魚臍毒瘡藥毒草毒蛇毒獸毒諸惡

瘡病解毒收功

續隨子

取仁去油取霜

五倍子

全

蝎

各五錢

山荳根

山茨菇

各一兩

硃

砂

雄黃

各二錢

麝

香

一錢

紅芽大戟

七錢

先將五倍子全蝎山荳根山茨菇大戟入木臼搗羅細末次研續隨子雄黃硃砂麝香和勻用

糯米糊丸分作三十五丸端午七夕重陽臘日  
淨室修合每服一丸生薑蜜水磨下井水浸研  
敷患處

飛龍奪命丹 正宗

治惡疽發背不痛或麻木或嘔吐昏憤

蝸牛 二十個  
另研 蟾酥 乳香 去油

銅綠 輕粉 膽礬

沒藥 去油 血竭 硃砂 各一錢

明礬 雄黃 各一錢 冰片

麝香 各三分

研細將研爛蝸牛和丸如菉荳大如丸不就入  
些酒糊丸每服七丸或九丸或十一丸用葱白  
三五寸病人自嚼吐於男左女右掌中包藥在  
內用煖酒和葱送下如人行五里汗出爲度無  
汗再用葱研爛裹藥服之此外科之聖藥也

蟬酥丸

諸惡瘡服之微汗卽消

雄黃

乳香

去油各蟾酥一分

一錢

用黃酒打麵糊丸菴荳大每服三丸葱白湯下  
不愈再一服

忍冬圓 集驗

療渴疾既愈之後須防發癰疽此圓大能止渴  
消毒並治五痔瘻瘤等證

金銀花

根莖花葉俱可用  
不拘多少

入瓶內以無灰好酒浸用糠火煨一宿取出晒  
乾入甘草少許研爲細末以所浸酒打麵糊丸  
如桐子大每服五十丸至百丸不拘時酒送下

十寶丹 濟生

海 蚌 二十一 硃 砂 輕 粉

寒 水 石 煨 雄 黃 銅 綠 各二錢

血 竭 蟬 酥 膽 礬 各一錢

麝 香 五分

研極細酒丸桐子大硃砂爲衣大人服七丸小兒三丸先嚼葱白頭三根吐男左女右手心包藥吞之黃酒送下盡醉被蓋出汗外用萬應靈丹點之內服此丸諸毒無不內消此外科之至



寶也救諸苦難尤爲便捷有志者宜共珍之

百效丸 金茂存

治一切大毒惡瘡無論已潰未潰

草烏頭

酒浸半日刮去皮切片炒

馬前子

切薄片炒黃色篩去毛淨

全當歸

切片酒拌曬乾炒

麻黃

去節不見火曬脆

直殭蠶

酒洗炒去絲

穿山甲

沙炒去沙各一兩

大甘草

不見火曬乾研五錢

右研細葱汁熬湯水法爲丸如芥子大曬乾磁

瓶密貯高年者五六分中年者七八分少年者

三分孕婦忌服凡服俱用葱汁白湯送下務須  
避風取汗如出汗後必須次日辰巳時方可起  
床見風如不遵戒守汗出見風則手足堅硬凡  
犯此者卽用甘草末酒調服卽解

神仙一醉忍冬湯

銀花藤

蒲公英

各一兩

沒

藥

去油

乳香

去油

雄

黃

各二錢

右藥用酒一瓶封固煮干餘沸再加白蜜四兩  
生葱七根再煮數沸去葱儘量飲醉以大蒜壓

之取汗即愈

五香追毒丸

治一切無名腫毒初起有餘之證疔瘡去毒定痛內消妙法

乳香 去油

血竭

巴豆霜

老君鬚

母丁香

連翹

沒藥 去油

沉香

廣木香

苦丁香 各一錢二分

右爲末煉蜜丸如芡實大硃砂爲衣每服一丸

或二丸空心食前酒送下行二三次後用冷粥  
補之

小蟬酥丸

治一切疔瘡腫毒時毒初起發汗

蟬酥一分  
明雄三分  
蜈蚣一條

研細酒糊丸桐子大每服五丸葱酒送下熱處  
發汗散之

發背腫毒

雄黃牛蹄殼洗淨火煨存性研細末酒調服五錢

次日服四錢酒調下重者三服全愈輕者或三錢

四錢神效

### 九流疽陰毒仙方

蜘蛛

壹個用銀罐化存性川貝母五錢去心

共乳細末分作二三服甜酒調服少刻週身作  
戰次日依前再服一次其疽毒盡消人若虛弱  
其藥分三日服恐攪不起

初起發背無名腫毒疔瘡

桃

芽三月探

桑

芽三月探陰乾各二錢

鐵

銹

雄黃

蟬

酥

酒浸化  
各一錢

研細搗丸如紅豆大每用一丸入五寸長葱頭  
內濕紙包煨香細嚼熱酒送下出汗自消

舌化丹

治疔瘡無名腫毒

辰砂

血竭

硼砂

乳香

去油

沒

藥

去油

雄黃

蟾

酥人乳浸化

輕

粉

冰

片

麝

香各等分

其乳細末於淨室中至誠修合勿令婦人雞犬  
見用頭生乳搗和丸如小麥大每用三丸含舌  
下嚙化嚙下出汗自消如無汗以熱酒催之

### 冷水金丹

腫毒惡瘡兼治痰痞老痰翻胃噎食傷寒發汗

海浮石

飛羅麩

各三兩

乳

香

去油

沒藥

去油

牛蒡子

各一兩

冰

片

麝香

各一錢

用蟾酥三錢七分五釐酒浸化爲丸菴豆大以

飛過辰砂五錢爲衣輕者冷水送下一九重者  
三丸牙痛只用一丸 忌雞魚小米一日戒怒  
鬱憂悶氣惱費心力

神化丹 一名醉消散

癰疽疔毒一切無名腫毒初起服之立消雙解  
表裏疎通經絡以毒攻毒削堅導滯如神

黑丑 頭末 母丁香 枳榔

何首烏 荊芥 荊三稜 醋炒

熟地 蓬莪朮 醋炒 巴豆



五靈脂

大黃

白荳蔻

去殼

桂枝

穿山甲

當歸

赤芍藥

川烏

小茴香

草烏

杏仁

炒

全蝎

去足

連翹

麻黃

甘草

桔梗

斑貓

雄黃

硃砂

各三錢

乳香

去油

沒藥

去油各二錢

麝香

五分

大蜈蚣

一條

各乳細末稱準和勻水盪爲丸如蘿蔔子大硃

砂爲衣每服叁分熱酒吞下盡醉爲度被蓋出

汗孕婦忌服體虛禁用

梅花點舌丹

臨濟超真大和尚

白梅花

陰乾一錢二分

冰片

西牛黃

膽酥

熊膽

各一錢

珍珠

麝香

各六分

硃砂

硼砂

砂

葶藶

乳香

去油

沒藥

去油

沉香

血竭

雄黃

黃

各二錢

右乳細將人乳浸膽酥熊膽爲丸每重三四厘

水飛金箔爲衣晒二日磁瓶收貯修合時預爲齋戒三日忌鷄犬婦人見聞

此丹專治對口癰疽發背疔瘡瘰癧乳癰一切無名腫毒每用一九含於舌底隨舌運動不可停止舌下化去一半時用白酒儘量飲醉出汗如重者先用酒送下二丸再嚙化一九如七歲小兒用酒化服一九患處不用敷藥膏藥自能生肌長肉取口全愈孕婦忌服

一方少

硼砂珍珠寧蘆  
血竭熊膽

加輕粉燭牛  
膽礬銅綠

秘授萬靈一粒九轉還丹臨濟超字輩寶聚和尚

治一切危急等症

眞鴉片

三兩冬研夏燉看鴉片眞僞法

眞者成塊視之如鴉毛

片之色研開如黃泥嗅之如青草味而帶香嚼之如黃連苦此爲眞者僞者亦成塊綠色或黑色研開亦黑色並不香雖賤無用

西牛黃

眞麝香

各一錢二分去毛

百草霜

九錢

右爲細末研勻然後將白米飯二兩四錢研如糊再下前四味再研勻爲丸每丸重三厘丸完川硃砂爲衣衣完入大封筒內封固放在翻轉

脚爐蓋內將包紮好草紙蓋好微微炭火烘三炷香每炷香搖動爐蓋三次三三見九名曰九轉還丹香完移過爐蓋待冷折封入磁瓶內聽用

凡用此丹大人每服一丸小兒八九歲一丸作二次服四五六七歲一丸作三次服三歲未週一丸作四次服無論大人小兒倘誤多服以濃茶飲之卽解 孕婦忌服

修合時務必三日前齋戒忌婦女鷄犬見聞

湯引開後

傷寒頭痛發熱生薑葱白湯下

赤帶滑石甘草湯下

傷風無汗惡寒麻黃桂枝湯下

陰證身冷自汗乾薑肉桂湯下

中風口眼歪斜天麻膽星湯下

小兒急慢驚風薄荷湯下

產後瘀血作痛桃仁紅花山查湯下

婦女經水不調香附艾葉湯下

偏正頭風羌活白芷湯下

霍亂吐瀉藿香木瓜生薑湯下

痰結頭痛甘菊天麻湯下

噤口痢人參升麻黃連石蓮子湯下

赤痢黃連湯下

白痢木香湯下

赤白痢黃連木香湯下

蟲脹青皮蘿蔔子湯下

水腫茯苓澤瀉湯下

一蟲牙川椒良薑湯下

一火牙石膏湯下

一青盲眼甘菊枸杞子湯下

一傷風咳嗽生薑紫蘇湯下

一久嗽寒痰生薑陳皮湯下

一久嗽痰火石膏知母湯下

一肺虛勞嗽人參麥冬五味子湯下

一冷風哮喘紫蘇欬冬花湯下

一遍身骨痛羌活獨活湯下

一迎風流淚蔓荊子湯下

一雲翳遮睛石決明湯下

一赤目腫痛防風荊芥湯下

一下元虛鹽湯下

一色癆石燕子湯下

一脾癆當歸湯下

一心癆遠志湯下

一損癆乳香湯下

一氣癆木香湯下

胞衣不下童便和酒下

跌打損傷紅花湯下

初起痞塊山查湯下

半身不遂左用桂枝羌活獨活全當歸紅花

湯下右用附子當歸赤芍紅花湯下

下部腫痛牛膝苡仁木瓜湯下

肚痛砂仁木香湯下

心痛良薑砂仁湯下

鬱痛山梔貝母湯下

疝痛茴香川椒吳黃橘核湯下

脇痛乳香湯下

咽喉腫痛桔梗甘草牛蒡子湯下

眼目昏花熟地當歸湯下

血貫瞳人元參赤芍湯下

閃腰挫氣蘇木紅花湯下

小便不通滑石甘草湯下

吐血鼻血芍藥山梔犀角牡丹皮湯下

泄瀉米飲湯下



一 瘡肉侵睛密蒙花湯下

一 瘡疾桃酥枝楊柳各三錢湯下

一 脫肛人參升麻湯下

一 腸風下血槐花炒黑棕櫚煨灰湯下

一 因寒翻胃丁香乾薑湯下

一 因熱翻胃竹茹木瓜湯下

一 眼生星障木賊草決明子湯下

一 風眼防風荆芥蔓荊子湯下

一 火眼黃連枳殼湯下

一 沙淋白帶茯苓半夏生薑湯下

一 血山崩阿膠續斷湯下

一 血枯經閉四物湯下

一 大瘰癧麻黃葳靈仙防風苦參湯下夏月加

黃連湯下

一 楊梅瘡黃連甘草山梔湯下

一 楊梅結毒土茯苓湯下

一 遍身生瘡金銀花若參湯下

一 無名腫毒貝母連翹銀花湯下

癰疽未潰皂角刺穿山甲湯下

痰核初起貝母生薑湯下

魚口便毒大黃湯下

濕痰流注貝母湯下

緊急疔瘡菊花根取汁和酒下

鵝膝瘋牛膝葳靈仙湯下

倉卒不及脩引者俱白湯下

## 雙解金桂丸

治發背諸毒初起木悶堅硬便秘脉沉實者

生大黃一觔

白芷十兩

共爲末水法疊丸每服三五錢五更時用連鬚  
大葱三根黃酒煎吞服被蓋出汗過二三時辰

俟大便行一二次爲效

此宜通攻利之劑也濟之以葱酒力能發汗故云雙解弱者行後隨用四君子湯補之如老人虛人每服只用一錢人參生薑湯送下過一時再一服但能得睡上身得汗則已

發背對口初起

黃 蓍

當

歸 各五錢

川

芎

一錢

金銀花

一兩

遠志肉

五錢

桔

梗

甘 草

各三錢

水煎服

至寶丹

癰疽腫毒發背對口乳癰結毒危險諸證

白

硫 用豆腐一塊厚二寸中挖一孔納硫於孔中以豆腐蓋砒酒煮三個時辰

猪牙皂

去皮酥炙

乳

香

去油

熊

膽

銅綠

水飛

荊芥穗

去梗

直殭蠶

穿山甲

炒

血竭

膽

礬

川烏

草

烏

全川烏酒浸剝去皮麪包煨熟取淨肉用

沒藥

去油

全

竭

石灰水洗去頭足尾瓦上焙乾

蟬蛻

去頭足

雄

黃

各二錢

麝

香

七分

硃

砂

水飛三分錢五分

蜈

蚣

大者五條酒蒸去足尾焙小者加倍

右藥以天醫吉日研極細末飛麵打糊爲丸每粒重四分再用硃砂三錢五分爲衣黃蠟作殼收藏臨用時用葱頭三寸生薑三片黃酒煎一小鍾將藥化開服隨量飲醉被蓋出汗至重者

二三服

癰疽門丹散主方

紅昇丹

一切瘡瘍潰後拔毒去腐生新長肉瘡口堅硬肉黯紫黑用丹少許鷄翎掃上立刻紅活外科若無升降二丹焉能立刻奏效

水銀 一兩

火硝 四兩

白礬 二兩

皂礬 六錢

雄黃

硃砂 各五錢

先將白礬皂礬火硝研碎入銅杓內加燒酒一杯燉化候一乾卽起研極細末另將水銀硃砂

雄黃共研細末以不見水銀星爲度再將硝礬末一共和入研勻

取陽城罐一個用鹽滷練紙筋或鹽滷和罐子泥練極熟將泥塘罐子上約一指厚陰乾不可有裂縫如有縫以罐子泥補之務要極乾方可裝藥入罐內罐口用鐵燈蓋蓋定加鐵梁於蓋上用鐵甩鐵絲紮緊再用綿紙蘸蜜塞罐口縫間外用煨過石膏細末醋調多刷固蓋上加炭火二塊使蓋熱罐口封固易乾

再用大鐵釘三根釘地上將罐子架釘上罐底  
置炭火堅大者數塊外砌百眼爐昇三炷香  
第一炷香用底火如火大則汞先飛上

第二炷香用大半罐火以筆蘸水時刻刷擦鐵  
蓋

第三炷香火平罐口用扇搨用筆蘸水頻頻掃  
蓋勿使蓋乾如乾則汞先飛上

三炷香盡去火冷定開看蓋上約有六七錢刮  
下研極細磁瓶密貯



另用鹽酒調罐子泥如稀糊式以鐵線繫筆頭  
在竹管上如陽城罐上有綠烟起卽永走也急  
以筆蘸鹽泥多多刷在出烟之處封固爲要  
昇出研細磁瓶收貯愈陳愈妙

一法收貯瓶內以蠟封口埋土內以去燥性

紅昇丹小毒用骨簪挑藥上瘡口上如癰疽口  
面大者用小篩羅挑藥於內以手輕輕彈之勻  
勻俱要上到如有管可用爛飯和紅昇丹撚成  
細條陰乾量瘡深淺取用插入瘡管內以膏貼

之其管自化

陽城罐昇煉紅昇丹名曰大昇不比三仙丹小  
昇力單只可施於瘡癰若癰疽大證非大昇不  
能應手

紅昇丹不獨提膿且能生肌如瘡毒淌水者用  
之次日卽轉稠膿此丹功效用之一面提膿一  
面長肉肌肉長平仍以此丹上之卽可結疤收  
口首尾並用所以爲神也

一法毒已提盡將收口時用紅昇丹加珍珠散

各等分乳勻名曰半提丹用之收功甚速

### 拔萃丹

提膿生肌化管如神

生 鉛

水 銀

火 硝

白 礬

青 鹽 各一兩

全研至水銀星不見爲度入陽城罐內鐵蓋蓋定以鐵梁鐵線紮緊鹽泥固濟先文後武火昇三炷香冷定開看蓋內昇藥刮下研細加水片乳勻收貯 火候俱全紅昇丹法則

凡昇藥罐底藥揜鏟下研細搽癬疥頗神

五虎粉

治發背疔瘡惡瘡如神起釘拔箭喉疳並效

白

礬

飛過

焰

硝

用雄豬膽三個取汁拌曬乾全礬研合各二兩

雄

黃

八錢五分

硃

砂

一兩全雄黃研細合一處

水

銀

一兩五錢

用小鐵鍋安定先將硝礬末堆鍋底中心用手

指捺一窩再將硃雄末傾放硝礬窩中又以手

指捺一窩再將水銀傾放硃雄窩中上用磁器

平口碗一隻蓋定外以鹽泥週圍封固放炭火上先文後武昇三炷香足則藥上升矣離火冷定去泥開看如沉香色爲佳研細磁瓶密貯每用時先將瘡頂上以乳汁或米湯點濕摻藥於上過一二時辰再摻一次卽散

小昇丹

卽三仙丹

水

銀壹兩

明礬

火

硝

各一兩二錢

用鐵鍋一隻將硝礬汞研細入鍋內用平口官

碗一隻

先用生薑片擦碗內外則不炸

蓋定碗口以潮皮紙擦

擠定鹽泥封口碗底俱泥固之用炭三觔爐內  
過圍砌緊勿令火氣出如碗上泥裂縫以鹽泥  
補之昇三炷線香爲度冷定開看碗內藥刮下  
研細磁瓶收貯用之提膿長肉小毒俱有功效  
一法鹽泥只封碗口不封鍋底鍋底上貼濕白  
紙一塊但看紙色轉黃則藥已昇上矣鍋底上以鐵稱錘壓  
之

一法以潮皮紙撚擠定碗口外以研細石膏末  
按緊不用鹽泥只用鐵錘壓之

萬應靈丹

濟生

一切癰疽發背諸毒有膿怕開刀者以針挑破  
浮皮用丹一厘醋調點患處卽潰頭出膿或發  
背癰疽大毒每用一厘針挑破醋調點患處一  
日上三次藥性內攻深可寸餘毒氣有門而洩  
則毒易消如根盤大者用丹五厘川貝母末一  
錢濃茶油調敷週圍必起黃泡自有黃水流出  
其毒自消

水銀

青鹽

各伍錢

皂

礬

一兩

生

鉛二錢五分與水銀全研碎

生

礬一兩五錢

火

硝一兩二分白砒

礪

砂

明

雄各一錢五分

右研極細末入小瓦罐內頓炭火上熔化俟藥

枯結住罐底用瓦盆一個將有藥罐倒置盆內

正中罐口以鹽泥封固另用一大盆盛水將藥

罐之盆安置水內罐口四圍以磚圍罐半截下

襯冷灰然後磚上及罐底俱架炭火先從頂上

着火從上而下先文後武三炷香為度冷定開



看盆內丹藥刮下研細磁瓶密貯

### 白降丹

凡癰疽無名大毒每用少許瘡大者用六七厘  
小者用一二厘水調敷瘡頭上初起者立刻起  
泡消散成膿者腐肉卽脫拔毒消腫誠乃奪命  
金丹也

水銀

食鹽

皂礬

火硝

白礬

各二兩

硃砂

雄黃

水飛各

三錢

硼砂

五錢

一方用礬砂

先將硃雄礬研細再入鹽硝礬汞皂研至不見水銀星爲度

將陽城罐放微火上徐徐挑藥入罐化盡微火逼令極乾所謂陰昇之法全在此刻如火大則汞先飛走如不乾則藥必倒塌無用其難如此也

再用空陽城罐一個兩口合上以好綿紙截寸許濶用罐子泥草鞋灰光粉三樣研細以鹽滷汁和練極熟兩罐口合緊一層泥一層紙糊五

六層候乾

將地挖一小坑用宣法碗盛水放坑內將空陽城罐放水碗內用瓦緊靠坑口鋪滿四圍用炭蓋齊地面將有藥陽城罐露地上圍以炭火煨之不可使炭火有空處計燃三炷香完去火冷定開看空陽城罐內約有丹藥一兩刮下研細磁瓶密貯

臨煨時如有綠烟起處急用罐子泥固之降藥之神不假刀砭一伏時便見功效勝於刀

針之險多矣

上降藥法 癰疽初起堅硬未成膿者用水調一二厘塗於瘡頂上不可貼膏藥少頃卽起一泡挑破出水自消 已成而內膿急脹按之隨手而起者此膿已熟矣用水調一二厘點正頂上以膏貼之一伏時太膿自洩不假刀針 如陰疽根脚走散瘡頭平陷卽用降丹七八厘或分許水調掃於瘡頭堅硬處次日卽轉紅活便是吉兆 如瘡毒內膿已成

久不穿潰者只要出一小頭怕頭出大了可用綿紙一塊量瘡大小剪一孔以水潤貼瘡上然後調降藥點放紙孔內揭去紙以膏貼之則所降之頭不致過大若瘡小藥大反令痛傷胃口熉及良肉不可不知

鼻塞耳挺點之自落

點痣亦落

初生小兒及婦女頭面皮肉嬌嫩不可多用如用之不善不無漫腫反招怨尤

楊梅瘡將初現之瘡用白降丹點三五個毒俱  
拔出

白降丹點在瘡毒上卽追蝕毒氣有幾分深必  
追至病根方止所以點後疼痛非常若內膿  
已脹皮殼不厚點之便不十分痛楚有用蟾  
酥化汁調白降丹用其疼稍減

凡癰疽以紅昇丹提膿兼用珍珠散收口每見  
升提過甚瘡口四邊起埂亦有瘡口新肉高  
凸者不如用陳白降丹火氣退盡少許全珍珠散

用之不但四邊瘡口平坦更且不留餘毒此  
又外科不知之妙訣也

水煉降藥法 新煉出白降丹研細用元色緞  
五寸將降藥篩勻緞上捲緊以麻線捆紮極  
緊放瓦銚內清水煮約一伏時內換水三次  
將緞卷取起掛風處陰乾然後打開以鷄翎  
掃下磁瓶收貯凡治癰疽用之並無痛楚

### 紫陽丹

提膿拔毒

水銀 銀硃 生鉛

百草霜 輕粉 杭粉

雄黃 各等分 麝香 宜少用

共研極細末每用少許搽之以膏貼之如治下

疳加兒茶

提毒丹 一名七星丹又名八仙丹

乳香 去油 沒藥 去油各二錢 元參 瓦上焙

前胡 瓦上焙 血竭 麝香 各四分

生斑猫 八錢去淨頭足翅陰陽瓦焙



右各乳極細末於端午正午時和勻磁瓶密貯  
凡初起腫毒每用二三厘先看瘡勢大小卽以  
膏藥照瘡大小週圍用大蒜搗如泥敷膏藥上  
中留一孔入藥於內次日卽起小泡挑去水泡  
卽消如已潰者摻藥於瘡孔內亦能拔毒生肌  
神驗

一方乳香沒藥

各一錢二分

血竭

六分

多冰片

四分

餘者

分兩俱全端午虔心焚香修合每用一分全  
大蒜搗如泥敷毒四圍將瘡頭挑破聽瘡口

流水外用膏藥中剪一孔貼之以俛瘡毒出其  
毒氣此神速癰疽疔瘡之聖藥也

陰陽至聖丹 岐天師

人參

廣三七

兒茶

水飛去砂

川楝子

各一兩

血

竭

透明者五錢

蜚

黃

乳香

去油各三錢

輕

粉

冰

片

各一錢

川貝母

去心二錢

共研至無聲爲度陽瘡每用二錢陰瘡每用五

錢搽於瘡上其餘瘡毒不消二次陰疽不消三

次全愈

馮氏援生膏

治諸般惡瘡及瘰癧鼠癭纔起者點破卽愈

雄黃 五錢

乳香 去油

沒藥 去油

血竭 各一錢

輕粉 各三錢

麝香 五分

右研細末用真炭灰一斗三升淋灰湯八九碗用桑柴文武火煎作三碗取一碗收留二碗盛磁器內候溫將藥入灰湯內用桑柳枝攪再以

好風化石灰一飯碗入藥湯內攪勻過宿候冷  
盛磁罐內凡遇惡瘡貼在當頭一日一次次日  
又一次瘡頭自然蝕破血水流去卽愈如藥乾  
將前收留灰湯潤之

海浮散 十法

搽癰疽瘡毒腐去新生乃回生保命之寶丹也

乳香

沒

藥

各等分

安箬葉上火炙去油乳細搽上以膏貼之此藥  
未盡則提膿外出如毒已盡則收口其神妙處

難以言喻

烏金膏 十法

去腐肉不傷新肉最為平善先用降香煎湯洗瘡

巴豆

去殼新瓦上炒黑色

研爛磁瓶收貯多寡看瘡勢大小酌量用之

靈寶如意丹

發背疔疽大毒

人參

乳香 去油

沒藥 去油

辰砂

甘草

兒茶

各一錢

琥珀

珍珠

各二分

阿膠

白芷

冰片

各一分

西牛黃

當門子

各五分

右乳細磁瓶密貯勿洩藥味

如用先將瘡用

金銀花甘草煎湯洗淨每日搽藥四五次用膏

蓋之膿水自然拔盡忌口味戒煩惱慎勞碌

發背對口潰爛不收口

三仙丹

一料方詳前

珍珠

一錢

乳香

香

云油

沒藥去油 血竭各二錢

共乳極細先將溫湯洗瘡棉花搥乾將藥摻上用竹紙蘸濕貼上一日一換

治背疽大潰僅存隔膜臨危者錦囊

鯽魚去腸實以羯羊糞烘焦爲末乾摻之瘡口自收神效方也

抵金散啟玄

治癰疽發背潰後爛開作痛

屎蜚五月五日收採不拘多少裝入竹筒內陰乾

研細磁瓶收貯凡用將末摻上

神功紫霞丹

太醫院

大蜈蚣

一條去頭足  
放瓦上焙脆

麝香二分

研細磁瓶收貯每用少許摻瘡頂上以膏蓋之

其頭即潰並不疼痛

拔毒生肌

紅昇丹

輕粉

車麻

去油各  
三錢

乳香

去油

黃丹

各二錢

石膏

煨一兩

琥珀

乳細一錢



燕乳細末搽上膏貼

諸瘡毒四邊紫黑不消瘡口不斂

紅昇丹

輕粉

雄黃

龍骨

各五錢

白蘇

密陀僧

海螵蛸

各一兩

麝香

一分

共乳極細搽上

金蟾化管丸

劉秘

治一切諸漏有管者雖彎曲之處皆能行到化

管如神

水銀三錢

明雄黃

一兩以二觔火酒漸煮漸添以酒盡為度

共乳細用紙包好取大罌墓

一個剖去腸只留肝肺

將藥

包入於肚內以線縫好聽用

銀硝

白

礬

各一兩

研勻入陽城罐內加水半茶鍾放火上熬令枯

於罐底取放地上再納罌墓於內鐵蓋蓋好鹽

泥固濟升文火二炷香中火一炷香武火一炷

香冷定開看蓋土靈藥刮下研細用蠶酥乳化

為丸如芥子大陰乾凡一切管用一丸放膏

藥上對管口自入到底方回嫩管自化老管自  
褪七日見效如未全褪再用一丸無不除根

癰疽門膏藥主方

仙方膏 經驗

白芷

紫荊皮

獨活

石菖蒲

赤芍

各二兩

高良薑

蜈蚣

刺蝟皮

蛇蛻

葶麻仁

鱉甲

白殭蠶

甘草

海風藤

連翹

天花粉

白芨

牛蒡子

大黃

川黃連

白蘇

當歸

千金子

血餘

金銀花

黃栢

穿山甲

防己

猪牙皂

柴胡

川貝母

桃仁

白附子

巴豆

明天麻

苦參

荆芥穗

紅花

黃耆

桔梗

黃芩

牛膝

防風

全蝎

麻黃

草烏

肉桂

烏藥

羌活 半夏 太戟

蘇木 各五錢 桃枝 槐枝

桑枝 柳枝 各截一寸長  
二十四段

用大磨豆蘇油十三觔將上藥入油內泡七日  
入銅鍋內熬至藥枯瀝渣復將油仍入鍋內熬  
至滴水成珠再撤淨藥脚下丹每油一觔下飛  
過黃丹八兩為則藥已成功入有銷鐵缸內以  
槐棍攪冷再入後末

血竭 四錢 乳香 去油 沒藥 去油各三  
錢三分

藿

香

分四錢五

研細攪勻又入後藥

珍珠

冰片

各一錢

沉

香

不見火四錢七分

當門子

分二錢一

木

香

不見火

松

香

各五錢四分

檀

香

不見火六錢

雄

黃

五錢五分

沉

香

不見火四錢七分

攪勻又入

潮

腦

三錢

取功此膏專治癰疽發背一切外證並貼五勞七傷筋骨疼痛跌打損傷婦人癰瘕帶下如神

神應萬驗膏

貼一切無名腫毒大瘡惡疽無論已破未破不  
過二三張即可收功每張用過以冷水洗去膿  
血仍可再貼每張量毒輕重用之俱有神效

桃枝

柳枝

杏枝

桑枝

槐枝

截作寸許  
長各二兩

用真麻油二十四兩小炭火熬滾將枝次第入  
油熬枯成炭瀝去渣再入

人頭髮

男女各半洗淨  
油膩一兩五錢



入油炸化再入

穿山甲

剪碎一兩五錢

入油炸粘再入

象皮

剪碎五錢

入油炸化再入

大梔子

一百個逐個捻破入油內離火浸一炷香再用微火頓一炷香再用大火炸成炭

取起冷定用夏布濾去渣再入淨鍋內稱準每

油二兩入炒過黃丹一兩熬至滴水成珠不散

離火一刻再入後藥

真礪砂

透明白亮者

血竭

兒茶

各二錢

乳細拌入膏內坐冷水中稍涼取起用水濕手  
扯捻百下使各藥和勻埋土內五日去火毒用  
時以井華凉水浸半日捻成片放布上熱湯熨

化貼

太乙膏

正宗

一切癰疽瘡瘍提膿生新神效

生地

土木鱉

元參

赤芍

大黃

白芷

當歸各五錢 乳香 沒藥各二錢

阿魏一錢 輕粉一錢五血餘一團

肉桂二錢五分 黃丹水飛六兩五錢

先將草藥入麻油一觔浸春五日夏三日秋七日冬十日傾入鍋內文武火熬至藥枯浮起爲度佳火片時用布袋濾淨藥渣將鍋展淨入油鍋內下血餘再熬以柳枝挑看俟血餘熬枯浮起方算熬熟每淨油一觔將炒過黃丹六兩五錢徐徐投入不住手攪候鍋內先發青烟後起

白烟叠叠升起其膏已成將膏滴入水中試看  
軟硬適中拿下鍋來方下阿魏散膏面上化過  
次下乳沒輕粉末攪勻傾入水內以柳木棍攪  
成一塊任攤貼肺癰腸癰卽以此膏爲丸服  
之並效

### 神仙太乙膏

治癰疽及一切惡毒不問年月深淺已未成膿  
蛇虎蜈螫犬咬湯火刀斧砍傷皆可內服外貼  
血氣不通溫酒送下赤白帶下當歸酒下喉痺

纏喉風並用新綿裹膏藥置口中含化一切風  
赤眼用膏捏作小餅貼太陽穴後以山梔子湯  
送下跌打傷損外貼內服橘皮湯下腰膝痛者  
外貼內服用鹽湯下唾血者桑白皮湯送下每  
服一丸如櫻桃大蛤粉爲衣其膏可收十年不  
壞愈久愈神

元參

川大黃

白芷

肉桂

當歸

赤芍

生地

各一兩

右剉碎用麻油二觔浸春五日夏三日秋七日  
冬十日火熬黑色濾去渣入黃丹一觔青柳枝  
不住手攪滴水成珠爲度傾入磁器中掘窖埋  
土中出火毒三日任用

新製加味太乙膏

錦囊

神治一切腫毒已潰未潰跌打損傷風濕氣痛  
古方因內服外貼故未免其功不專今特定此  
方專爲外貼而設其拔毒外治之功較前更勝  
也

亂

髮

一大團以黑潤者佳 草薢仁 二百粒搗碎

用真薢油二十四兩煎滾入亂髮以柳桃枝不住手攪令髮熔化再入草薢子煎至髮化草薢仁枯再入後藥慢火熬之

大黃

切片

黑元參

當

歸

各三兩

生地黃

切片四兩

肉

桂

去淨粗皮

白

芷

赤芍

各二兩

煎至藥色枯黑濾去渣慢火熬濃方入後四味取之軟硬得宜滴水成珠爲度夏月宜畧老些

冬天宜畧嫩些

明松香

一筋搗碎入大葱管內以線縛好放碗內隔湯蒸化取出候冷去葱研細八兩先下松香次下黃丹

真黃丹

二十兩其色黃者爲真用水飛曬乾炒黑色十兩若色紅者乃東丹也勿用

滴乳香

真沒藥俱箬上烘去油研細各二兩

四味取入成膏藏磁器中旋用旋攤

秘傳太乙萬靈膏

治一切癰疽發背七十二般疱癰三十六種疔毒無名腫毒痰核癰瘰內損骨節外傷皮肉手



足麻木不仁流注疼痛膈前背後吊起刺痛等  
證初起貼之腫消痛止已潰貼之膿乾肌生功  
效如神

羌活

革蔴仁

蟬蛻

大蜂房

蜈蚣

敗龜版

苦參

猪皂角

元參

槐角子

青蒿

過山龍

甘草

半枝蓮

荆芥

蕪艾葉

黃芩

仙人掌

川椒

蒲公英

白薇

龍膽草

防風

忍冬藤

白芨

生附子

大黃

石菖蒲

梔子

赤芍藥

獨活

何首烏

黃耆

蛇床子

桔梗

黑牽牛

漏蘆

木鱉子

去殼

肉桂

大楓子

巴豆

去殼

地骨皮

昆布

蒼耳子

黃柏

青木香

連翹

鼠粘子

桃仁

白殭蠶

血餘

穿山甲

黃連

當歸

牛膝

蒼朮

升麻

蛇蛻

檳榔

槐枝

柳枝

桃枝

各一兩

右六十二味咀片用真蘇油十觔浸春五夏三  
秋四冬十日入大鐵鍋內燉至烟盡爲度先去  
粗渣冷定用大皮紙以針戳眼濾去細渣復入

淨鍋內熬至黑色滴水成珠不散每油一觔入  
淘過黃丹炒紫色者八兩如無黃丹用水飛細  
密陀僧末八兩代之  
下丹之時以柳棍不住手攪勻離火再下

白芷

天南星

草烏

北細辛

半夏

高良薑

川烏

各一兩

右七味俱生研細末篩入膏內攪勻冷定再下

後開乳極細末

海螵蛸

一兩

乳香

去油

百草霜

沒藥

去油

鷄肫皮

血竭

象牙末

雄黃

寒水石

兒茶

白石脂

硃砂

赤石脂

輕粉

各五錢

青魚膽

熊膽

各三錢

甘松

三柰

潮腦

冰片

麝香

琥珀

珍珠

龍骨

水

銀 各二錢

細末篩入攪勻傾入冷水內扯拔換水浸三日

拔去火毒然後裝磁鉢內臨用攤貼

普救萬全膏

十法

治一切風氣走注疼痛並白虎歷節風鶴膝風  
寒濕流注癰疽發背疔瘡癰癰跌打損傷腹中  
痞塊多年瘧疾如頑痰瘀血腹痛泄瀉小兒疳  
積女人癥瘕諸證並貼患處咳嗽瘧疾貼背脊  
心第七椎予製此膏倘貼後起泡出水此是病  
氣本深盡被藥力拔出乃吉兆也不  
之

藿香

海風簾

驚甲

紫荊皮

白芷

廣木香

防風

猪牙皂

桂枝

葳靈仙

半夏

草薢子

藁本

蘼艾茸

丁香

白殭蠶

黃芩

露蜂房

蘇木

川續斷

連翹

赤芍藥

白芨

蘿蔔子

丁皮

高良薑

檀香

貝母

黑山梔

苦參

陳枳殼

烏藥

白蘚皮

猴薑

天南星

白蘇

荊芥穗

全蝎

生地黃

麻黃

五加皮

秦艽

當歸尾

蒼朮

大楓子

草烏

北細辛

獨活

金銀花

川芎

香附子

甘草

生附子

杏仁



羌活

蟬蛻

元參

肉桂

牛膝

桃仁

紅花

川烏

各一兩五錢

大黃

三兩

蛇蛻

五條

大蜈蚣

三十五條

柳枝

槐枝

桑枝

桃枝

楝枝

榆枝

楮枝

各三十五寸

男子血餘

三兩

以上七十三味俱浸油

真麻油

二十觔天平子秤

松 香 一百觔棕皮燒淨

百草霜 十觔篩過

冬浸九宿春秋浸七宿夏浸五宿分數次入鍋文武火熬至藥枯油黑滴水成珠爲度濾去渣稱明每藥油十二兩下濾淨片子松香四觔全熬至滴水不散每鍋下百草霜細末六兩勿住手攪俟火候成則傾入水缸中以棒攪和成塊用兩人扯掇數次磁鉢收貯

一法治瘡疽用血丹收膏更妙每油一觔用血

丹六兩

仙傳奪命膏

邵秘

治發背對口一切腫毒卽日見效揭下再貼一人又能消去

驢蹄

一個

大鯽魚

商陸

各一觔

山羊角

三個

芫花

土木鱉

白芨

番木鱉

大戟

露蜂房

白薇

紅花

元參

蘓木

桃仁

蛇 蛻 各一兩 當歸尾

黃牛角腮

巴豆肉 乾蟾皮

猪懸蹄甲

南星 半夏

穿山甲 各二兩

大黃 三兩 革蘇仁

蒼耳嫩頭 各四兩

金線吊蠻墓 一個

用蘇油四觔全藥熬枯去渣熬至滴水成珠爲度每熟油一觔入炒官粉八兩収成膏再下

乳香 去油 沒藥 去油

麝香

芸香 輕粉 各三錢

研細攪勻收貯

如貼腫毒未破者用敷腫毒末藥摻上貼

凡貼痞塊用針刺患上三針如品字樣外用阿  
魏蜈蚣穿山甲麝香各等分研爲細末只稱  
一分摻於針眼內餘者摻膏上貼

凡貼瘋氣用鬧羊花

五錢燒酒拌晒乾  
三次炒脆爲末 麝香三分

乳勻摻膏上貼

車門一笑膏 邵秘

專貼寒濕諸瘋疼痛貼骨癰疽

白芷

川芎

防風

黑栗殼

甘松

川羌活

三柰

川獨活

藁本

高良薑

官桂

大茴香

秦艽

小茴香

麻黃

葳靈仙

川椒

各二兩

真附子

草烏

天南星

乾薑

穿山甲

大黃

鬧楊花

火酒拌

半夏

各四兩

老葱

老薑

各二觔

右藥用麻油三觔桐油半觔入藥浸熬枯去渣  
復入淨鍋內熬至滴水成珠入

製松香

四觔

土硫黃

密陀僧

各一觔  
乳細

取之膏成冷定再下

廣木香

五錢

乳香

去油

沒

藥

去油各  
三錢

研細攪勻再下

潮

腦

一兩

麝

香

三錢

和勻取貯任攤用

陰陽至聖膏

岐天師

治陰陽癰疽大毒

金銀花

一觔

人參

茜草根

各五錢

生地

八兩

牡丹皮

牛膝

生甘草

荆芥

各一兩

元參

五兩

當歸

麥門冬

黃耆

各三兩

川芎

二兩

用蘇油五觔煎數沸將渣濾淨再熬至滴水成

珠入

廣木香

沒藥

乳香



血竭 各一兩  
象皮 五錢  
麝香 一錢

黃丹 二觔  
水飛去砂

各乳細先下黃丹再下細藥入油中少煎攪勻  
藏磁罐內收之每發背用膏一兩攤一張其餘  
量瘡大小用之

呂祖紫金奪命膏

貼一切多年久不收口惡瘡結毒癰瘰冷瘤痞  
塊跌打骨斷兩截者

川黃連

全蝎

穿山甲

三兩入鍋內熬化看老嫩火候得法取起傾鉢  
五錢內再入後藥

乳

香

去油淨

沒

藥

去油淨

血

竭

龍

骨

錢煨各五

右各乳細入膏內用槐柳條攪勻再入

礪

硃

角

硃

俱研至無聲爲度各二兩

又攪均勻連鉢頭放在潮濕地上頓多日出火

毒任攤貼

發背膏

楊廷陞

乳香去油

杭粉

血竭

鮮紅者

白兒茶

沒

藥

去油

黃

丹

炒一次洵  
一次九回

銀硃

各四兩

銅

綠

三錢

逐味另研無聲爲度再合一處用時照證大小  
取夾油連四紙一塊以銀針多戳小眼每張準  
稱藥末五錢真麻油調攤紙上再用油紙一塊  
蓋之週圍用線縫好貼患處軟絹紮緊過三日  
將膏揭開濃煎葱湯洗淨軟絹挹乾將膏翻過  
用銀針照前多戳小孔貼之無火之人內服十

全大補湯有火之人減去肉桂葦棗服之兼以飲食滋補至重者用二張

發背對口膏

楊廷陞五金膏

初起自消已成卽潰

番木鱉

水浸刮去毛

土木鱉

去殼

革蔴仁

去殼各一兩四錢

用清油一觔浸春三日夏五日秋七日冬十日

文武火熬焦色濾清復入鍋內熬至滴水成珠

用密陀僧

龍牙有金星起者六兩研細

收膏再加金箔

四十張

剔入膏內用柳枝攪勻稍待用磁器置水將膏

傾入水內如用時盛杓內化開攤貼愈陳愈妙

鯽魚膏 吳近宸

貼一切無名腫毒未成卽散已成拔毒提膿並

治膿窠瘡癰

大蟹蟄 活烏背鯽魚 各七個

草蘇仁 十二兩

蘇油二觔全蟹蟄鯽魚草蘇子文武火熬枯濾

去渣熬至滴水成珠離火入

真輕粉 四兩 鉛粉 十二兩

收藏臨用取膏攤貼

鯽魚膏

貼癰毒瘡癰

大鯽魚

一尾

芭

荳

四兩

草麻仁

六兩

甘草

五錢

用菜油麻油各一觔先將鯽魚炸枯去渣再入

芭荳草麻甘草熬枯濾淨熬滾離火將鉛粉徐

徐投下攪勻成膏攤貼

碧玉膏

貼癰疽發背癰癰馬刀乳癰乳巖流火流注腫塊風毒橫痃痔漏囊癰冬瓜癰貼骨疽一切腰

背髀腿毒癰多骨疽蟬拱頭脚隱漏蹄等證

草麻仁 去皮尖搗爛

杏仁 去皮搗爛各四十九粒

銅綠 二兩七錢用水一碗將銅綠研細投入水中攪勻

片松香 五觔研細篩過聽用

用真麻油十二兩入鍋內熬滾次下草麻杏仁熬至滴水成珠為度夏布濾去渣將油復入淨鍋內用文武火熬滾徐徐投下松香末用桃槐

枝不住手攪勻傾入磁盆內候膏將凝然後入銅綠水於膏內仍不住手攪勻然後加水浸之用手揉扯以去火毒另用磁罐或銅杓盛貯數月後用熱湯燉化攤貼此膏活血止痛拔毒消腫飲毒透膿去腐生新

### 紫金膏

貼一切無名腫毒惡瘡兼治風濕流火小兒痘毒宜端午七夕重陽天醫天德月德日配合

明松香

四兩夏用紅者冬用白者秋冬紅白各半以火熬滾入水內攪拌百十下研末若貼



痘毒松香用黃荳浸水入銅內候  
煮化待溫照上扯按研細末四兩

草麻仁

二兩研細放細篩羅裏上用穿山甲往  
來刮之取羅下者用之上面粗者去之

輕粉

五錢

銀硃

銅

綠

各二錢五分

製畢用猪油

去衣膜

拌藥放青石上用鐵鎚搗數

千下盛磁瓶內用時攤油紙上貼凡貼毒將

膏中剪一孔露頂透氣能貼多年痘毒若貼流

火竟貼頂上不必剪孔

極效膏

川烏

草烏

元參

大黃 生地 杏仁

當歸 赤芍 金銀花

白芷 各一兩  
二錢

藤油一觔四兩浸藥慢火熬加

桃枝 柳枝 槐枝

桑枝 榆枝 各十寸

熬枯去渣復熬至滴水成珠爲度再加

銀硃 一兩 銅綠 八錢 水粉 四兩

入油攪勻熬黑再加

黃 蠟

白 蠟 各一錢

化勻再加松香収之老嫩得宜入水缸拔出火  
毒任攤貼

商陸膏

貼瘡毒

商 陸 六兩

牛蒡子

防 風

金銀花

荆 芥

當歸尾

連 翹

赤芍藥

紅 花

茅蒼朮

甘 草 各五錢

麻油二觔熬枯去渣用密陀僧一觔収成膏用

紅玉膏

濟生

貼癰疽瘰癧乳癰等證

乳香

另研

沒藥

另研各二兩

草薢仁

四百粒

木鱉子

去殼二兩四錢

當歸

四兩

血餘

五錢

兒茶

血竭

白蠟

黃蠟

各一錢

嫩楊枝

一兩打碎

黃丹

飛四兩

豆麻油

八兩

芸香

白嫩者一觔四兩

先將麻油全楊柳枝當歸血餘熬數滾絞去渣

育紅膏

將油全芸香草麻木驚蒸熟絞去渣入黃白蠟  
將成膏入黃丹離火下乳沒兒竭末攪勻成膏

腫毒瘡癰

老松香 四錢

潮腦 一錢

輕粉 八分

銀硃 七分

銅綠

冰片 各一分  
五厘

麝香 一分

草蘇仁 二錢夏月只用  
一錢六分

研細重湯燉化忌見火任攤貼

腫毒瘡癰膏

當歸

金銀花

防風

木鱉子

元參

生甘草

白芨

石菖蒲

連翹

生大黃

白芷

生地黄

各四錢

麻油一觔四兩全入淨鍋內熬枯瀝去渣復入淨鍋熬至滴水成珠爲度入飛過炒黃丹八兩收成膏離火入白蠟黃蠟各二錢化盡再入

乳

香

去油

沒

藥

去油

輕

粉

各二錢

研細末和入任攤貼

救苦膏

貼癰疽初起卽消已成卽潰已潰卽斂實有消腫定痛之效須擇吉期虔誠修合

生薑

大蒜頭

槐

枝

向陽者各一觔

葱

白

半觔

花

椒

去目二兩

黃

丹

水飛淨二觔

麻油四觔文武火熬枯濾去渣再熬以桃柳枝

不住手攪至滴水成珠再下飛丹攪勻候冷取

起攤貼

紅膏藥

貼左癱右瘓筋骨疼痛漏肩風跌打損傷

松

香

五觔

童便內浸三個月取出酒乾如不能三個月

可將松香焙化傾入童便內取出又焙化傾童便內如此九次再換水煮過用之

第一次

用葱十觔取汁三碗入鍋內將松香化開入藤油四兩攪勻傾入水盆內以手扯拔取起

第二次

用生薑十觔取汁三碗入鍋內將松香化開入藤油二兩攪勻傾入水盆內以手扯拔取起

第三次

用萊菔一升煮汁三碗入鍋內將松香化開入藤油二兩攪勻傾入水盆內以手扯拔取起



第四次

用火酒一觔入鍋內將松香化開入藤油三兩攪勻傾入水盆內以手扯拔取起

第五次

用好醋一觔入鍋內將松香化開入藤油二兩攪勻傾入水盆內以手扯拔取起

第六次

用蒼朮 開陽花 川烏 草烏 天南星 半夏 各二兩 水二十碗煎汁五六碗入鍋內將松香化開入藤油四兩攪勻傾入水盆內以手扯拔取起

第七次

復將松香入淨鍋內溶化候各汁取乾為度

然後下自煨礬紅細末四兩攪勻成膏入鉢

封固攤貼

干槌膏

貼癰疽疔毒初起卽消如治瘰癧連根拔出小兒鰓拱頭膿落久不收口

嫩松香

四兩

巴荳仁

五粒

草蘇仁

七錢

杏仁

去皮

乳香

去油

沒藥

去油

銅綠

各一錢

共入石臼內搗二千餘下卽成膏矣取起浸清水中用時隨瘡大小用手捻成薄片貼瘡上以

絹蓋之

紫金膏

貼寒濕氣漏肩風諸般疼痛立止

白芷 六錢

關羊花

三柰

大茴香

毒皮

草烏

川烏

葳靈仙

甘松

小茴香

大黃

獨活 各七錢

乾蟾 一個

亂頭髮 三兩

麻油四十兩全藥入鍋熬至髮化滴水成珠再

下

密陀僧

研細十兩

收成膏再下

松

香

葱汁薑汁

鳳仙花汁各煮一次研細

入膏化盡攪勻傾在鉢內重湯燉化再下

潮

腦

七錢

膏

黛

桂

皮

各六錢

丁

香

雄

黃

各五錢

輕

粉

四錢

血

竭

乳

香

去油

沒

藥

去油

兒

茶

各三錢

滑

石

三錢

龍

骨

二錢五分

麝香 片 各五分

攪入和勻收貯 攤宜攤厚些貼立刻止痛

瘡腫風濕筋痛膏藥

注

桐油 入兩 嫩松香 白者一西 硃 上好者

黃丹 飛炒各 葱汁 薑汁 各一茶

乳香 去油 藥 去油研 百草霜 一升五

先煎桐油四五滾下 松香又十數滾下 葱薑汁

再三五滾下 西硃再 四五滾下 黃丹離火再下

乳沒再下 百草霜攪勻 收藏任攤貼

萬應膏

貼內外諸證

好松香

十觔

葱汁

生薑汁

各二觔

黃栢

生天黃

甘草

苦

參

各二兩

蒼朮

一兩

全入鍋內熬至水氣升盡再入真麻油三觔熬

至滴少許入水中約看凝片不散卽是火候已

到但須不時以竹片攪之免其巴底隨用麻布

一方過入水中水用木罏一隻貯水大半鋼蹄

傾膏時將鋼週圍發濕免得膏滋粘鋼膏既入

鋼再取起捏去水頭復入淨鍋內熬化加

乳香去油研沒藥去油研黃蠟各六兩

熬化撤去火再入

百草霜篩細四兩

勺勺篩入攪勻另用麻布一方濾入水內扯捏成團平日浸水內臨用時取起攤貼如火候太老量加麻油少許可也

紅玉膏

拔毒去膿

蛇 蛻

蜈 蚣 各一條頭

髮 垢 洗去油

黃

蠟 各二兩 香油 四兩

全熬濾清用黃丹取膏再下黃蠟熔化攤貼

黃金膏

拔毒生肌

猪板油

四兩

乳 香

去油

沒

藥

去油各二錢

熬枯去渣加黃蠟白蠟各一兩熔化再下黃柏

細末五錢攪勻候冷加冰片一錢成膏攤貼



五枝膏

貼瘡毒兼治瘋氣痛

桃枝

柳枝

槐枝

桑枝

棗枝

各十寸

銀

銷四兩

麻油二十四兩將上藥熬枯濾清再熬至滴水

成珠爲度以黃丹取之攤貼患處如作癰起泡

即可揭去凡已潰者切不可貼

槐枝膏

貼瘡癰

槐枝

取二三寸長  
三百六十段

真麻油三觔入銅鍋內熬至枝枯黑爲度用夏  
布濾去渣再入淨鍋內熬至滴水成珠入密陀  
僧細末半匙攪勻再入

龍骨煨

象皮

砂炒成珠

血餘

乳香

去油

沒藥

去油

赤石脂

各五錢

研細攪勻務須老嫩得宜收貯攤貼

肝張膏

腫毒已潰者貼之長肉

葶藶仁 八錢

大黃

紅花

白芷

木鱉仁

生地

當歸 各三錢

黃柏

甘草

牡丹皮

赤芍藥

黃芩

全蝎

蟬蛻

防風

穿山甲

白僵蠶

獨活

乳香 去油

沒藥 去油

肉桂

川黃連

元參 各二錢

共炒黑色用真麻油八兩浸三日入鍋內熬百

沸用大阡張紙放油內提透鋪地上出火毒隨  
瘡大小剪貼如楊梅瘡加活蝦蟇二條全熬

丹油膏

畢勵廷

真麻油

一觔

桃枝

柳

枝

各四十  
九寸

浸七日入鍋內熬至滴水成珠濾去渣淨入飛  
過血丹八兩取成膏貼一切瘡癰

丹油膏

桐油一觔放鍋內畧滾片時不待白沫盡卽下飛  
過炒黃丹五兩細細篩下候黑色卽成膏矣貼一

切瘡毒

製黃丹法

黃丹炒紫色傾入鋼內用滾水一桶泡之再汲涼  
水滿鋼浸一夜去水曬乾再炒如法再製一次務  
令曬乾研極細收貯留爲熬一切膏藥之用